

Les 5 espèces de rori autorisées à la pêche commerciale en Polynésie française

Rori titi blanc



Holothurie blanche à mamelles

Holothuria fuscogilva
Nom tahitien : Rori ù uouo
Nom usuel : Rori titi blanc

Valeur commerciale : forte
Habitat : lagons et passes, sur sol pierreux ou sable
Profondeur : 3 à 40 m
Coloration : variable : brun foncé ou blanc crémeux, avec ou sans taches; face ventrale brun clair. Face dorsale peut être recouverte de sable.
Morphologie : corps épais à tétons latéraux pointus («mamelles»). Texture grossière, papilles très courtes. Anus terminal à petites dents.
Taille : maximum 55 cm

Période d'interdiction de pêche
du 1er novembre au 31 janvier
Taille minimale

Pêche commerciale et vivrière
(alimentation) : frais 35cm / séché 15cm

Rori titi noir



Holothurie noire à mamelles

Holothuria whitmaei
Nom tahitien : Rori ù 'ere'ere
Nom usuel : Rori titi noir

Valeur commerciale : forte
Habitat : platiers, fronts récifaux et passes sur dalles coralliennes ou sable
Profondeur : 1 à 30 m
Coloration : Toujours noire, face dorsale souvent couverte de sable; face ventrale gris foncé.
Morphologie : corps épais à protubérances latérales («mamelles»). Texture rugueuse, papilles très courtes. Anus terminal à petites dents.
Taille : maximum 54 cm
Ancienne désignation en Océanie :
Holothuria nobilis

Période d'interdiction de pêche
du 1er juin au 31 août
Taille minimale

Pêche commerciale et vivrière
(alimentation) : frais 30cm / séché 15cm

Rori ananas



Holothurie ananas

Thelenota ananas
Nom tahitien : Rori euata - Rori painapo
Nom usuel : Rori ananas

Valeur commerciale : moyenne
Habitat : lagons, dans des zones détritiques, passes et pentes externes
Profondeur : 1 à 35 m
Coloration : Rose foncé à brun-rouge.
Morphologie : Grandes papilles coniques sur tout le corps, en particulier sur les flancs ventraux et les extrémités. Face dorsale arquée, face ventrale aplatie. Anus terminal.
Taille : maximum 70 cm

Période d'interdiction de pêche
du 1er novembre au 31 janvier
Taille minimale

Pêche commerciale et vivrière
(alimentation) : frais 45cm / séché 20cm

Rori léopard



Holothurie léopard

Bohadschia argus
Nom tahitien : Rori ruahine
Nom usuel : Rori vermicelle ou léopard

Valeur commerciale : moyenne
Habitat : habituellement sur le sable à la base des pentes récifales, ou sur les platiers et dans le lagon
Profondeur : 1 à 30 m
Coloration : gris clair, brun ou parfois mauve, avec des tâches ocellées caractéristiques avec un centre foncé.
Morphologie : corps cylindrique à face ventrale aplatie. Anus quasi-dorsal, expulse facilement des tubes de Cuvier.
Taille : maximum 60 cm

Période d'interdiction de pêche
du 1er novembre au 31 janvier
Taille minimale

Pêche commerciale et vivrière
(alimentation) : frais 40cm / séché 15cm

Rori marron de récif



Holothurie brune des brisants

Actinopyga mauritiana
Nom tahitien : Rori papa'o
Nom usuel : Rori marron de récif

Valeur commerciale : moyenne
Habitat : zones où les vagues viennent se briser sur l'extérieur du récif et pentes externes.
Profondeur : 0 à 10 m
Coloration : brun rouille, avec des marbrures et taches blanchâtres.
Morphologie : corps rigide de section trapézoïdale; partie ventrale à nombreux podia. Cinq dents anales.
Taille : maximum 38 cm

Période d'interdiction de pêche
du 1er novembre au 31 janvier
Taille minimale

Pêche commerciale et vivrière
(alimentation) : frais 20cm / séché 10cm